

Symtombaserad icketraumatisk akutsjukvård för vuxna

Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om [vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar](#).

Du har sökt på ett kursämne. Kursämnet beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

Vill du söka efter fler kursämnen, gå till [Sök kursämnen för ST](#)

Symtombaserad icketraumatisk akutsjukvård för vuxna

Målgrupp:	När i utbildningen:	Ämnets innehåll svarar mot delmål:	
Akutsjukvård	<input checked="" type="checkbox"/> Tidigt <input type="checkbox"/> Mitten <input type="checkbox"/> Sent	Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma och behandla akut sjuka vuxna patienter, med fokus på icketraumatiska åkommor. Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan: <ul style="list-style-type: none"> • Identifiera, differentiera och behandla akuta sjukdomssymtom samt skapa
Geriatrisk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidigt <input checked="" type="checkbox"/> Mitten <input type="checkbox"/> Sent	Till stor del: 4 Till viss del: 2, 3, 8	
Internmedicin	<input checked="" type="checkbox"/> Tidigt <input checked="" type="checkbox"/> Mitten <input type="checkbox"/> Sent	Till stor del: 1, 4, 5, 7, 8 Till viss del: 3, 9, 11	

hypotes om sjukdomsdiagnos hos såväl tidigare friska som de med multifaktoriell sjukdomsbakgrund.

- Värdera symptomens allvarlighetsgrad och identifiera patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitalfunktioner.
- Bedöma, särskilja och behandla akut och subakut insättande symptom såsom andnöd, yrsel, huvudvärk, neurologiskt bortfall, fallbenägenhet, bröstsmärta, bensvullnad, buksmärta, illamående, viktnedgång, feber, blödningar, svimning, cirkulations-stillestånd, medvetlöshet, trötthet, förvirring etc.
- Använda förekommande skattningsskalor som till exempel Modified Early Warning Scale (MEWS), Glasgow Coma Scale (GCS) och Reaction Level Scale (RLS).
- Förebygga och behandla sviktande vitala funktioner.
- Identifiera och bedöma indikationer för vidare utredning, initial behandling samt stabilisering.
- Generera hypotes om preliminär diagnos och differentialdiagnoser, prognos samt behandling.
- Ta ställning till lämplig vårdnivå.
- Värdera och ta ställning till behandlingsbegränsning ur ett medicinskt, legalt och etiskt perspektiv.
- Tillämpa ett effektivt samarbete med övriga yrkeskategorier, anpassat till tillgängliga resurser i den akuta situationen.